



Determining the Eco-Efficiency of Major Crops in Selected Regions of Khuzestan Province

M. Mardani Najafabadi^{1*}, A. Abdeshahi², E. Ahani³

Received: 18-09-2022

Revised: 30-01-2023

Accepted: 13-02-2023

Available Online: 13-02-2023

How to cite this article:

Mardani Najafabadi, M., Abdeshahi, A., & Ahani, E. (2023). Determining the eco-efficiency of major crops in selected regions of Khuzestan province. *Journal of Agricultural Economics & Development*, 37(3), 271-287. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22067/jead.2023.78856.1158>

Introduction

The relationship between economic development and the environment is known as one of the most important issues facing societies. If in the context of sustainable development, economic and environmental activities are considered together, the environment and economic development are two complementary factors and, as a result, it will lead to ecological balance. In this case, economic activities will not disturb this balance. Presently, the imperative of safeguarding the environment and attaining sustainable development has ascended to a prominent position on the agendas of diverse societies, Iran included. This commitment is underscored by the execution of comprehensive economic, social, and cultural initiatives aimed at fostering long-term ecological resilience and balanced societal progress. Therefore, to preserve the environment and meet the goals of sustainable development, as well as to guide and rationally manage plans and projects, especially in the agricultural sector, serious measures should be taken. Therefore, this study was carried out to evaluate the operational, environmental, and eco-efficiency of the major agricultural products of the irrigation and drainage networks of Gotvand.

The irrigation and drainage network of Gotvand is located in the southwest of Iran in Khuzestan province. This network is designed to irrigate lands located in three regions of Gotvand, Aghili, and Dimcheh, enclosed between two rivers, Karun and Lor. According to the official statistics of government organizations, the consumption of fertilizers and chemical poisons in the lands covered by this network is 3.6 times the average limit in Iran. The excess irrigation water in this network is returned to the rivers by the built-in drains and causes water pollution downstream of the network. Therefore, considering that environmental protection is one of the most important aspects of sustainable development, it is very important to investigate the effects of the use of pesticides and chemical fertilizers in agriculture and to introduce solutions to improve the efficiency of the environment in the study area.

Materials and Methods

Eco-efficiency includes operational and environmental impacts, which are presented as the ratio of the weighted sum of outputs to the weighted sum of inputs (operational inputs + environmental inputs). However, since agricultural activities are carried out in uncertain environmental conditions, there is uncertainty regarding inputs and outputs. The uncertainty in some of the effective input and output parameters in the ranking of networks, and as a result, the inaccuracy of the model calculation results, and the need to pay attention to the use of uncertainty models, make it more obvious. Therefore, in the present study, to include the conditions of uncertainty

1 and 2- Associate Professors of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

(*- Corresponding Author Email: m.mardani@asnrukh.ac.ir)

3- Lecturer in the Department of Accounting and Economics at Bozorgmehr Qaenat and Torbat Heydarieh University
<https://doi.org/10.22067/jead.2023.78856.1158>

and risk, the robust data envelopment analysis (RDEA) model was used, which is one of the most powerful and useful models in conditions of uncertainty. The required data were collected by completing a questionnaire of the Gotvand, Aghili, and Dimche regions using a simple random sampling method in 2019.

Results and Discussion

The alfalfa producers in the Gotvand region assigned the highest environmental and Eco-efficiency by obtaining points in the range of 81 to 89 percent and 90 to 96 percent, respectively. The rice crop in the Aghili region had the highest types of operational efficiency based on different levels of deviation probability in the range of 77-87%, environmental efficiency in the range of 80-90%, and environmental-economic efficiency in the range of 87-95%. Dimanche sugarcane region has the highest average of efficiency types for different levels of deviation probability by obtaining points in the range of 78 to 90, 80 to 89, and 87 to 95 respectively for operational, environmental, and Eco-efficiency. Comparing the results of technical efficiency with environmental efficiency shows the lack of attention and skill of farmers in the correct and optimal use of production inputs. Therefore, it is necessary to hold educational and promotional classes to empower farmers to improve production methods and optimal consumption of inputs to improve farmers' income and increase their profits. Given that a substantial portion of energy consumption within the agricultural sector is attributed to fuels and diesel, optimizing energy usage and promoting the adoption of newer, less polluting energy sources emerge as crucial imperatives. Enhancing environmental efficiency in this context involves a strategic focus on reducing reliance on traditional, environmentally taxing energy forms in favor of more sustainable alternatives.

Conclusion

The average operating efficiency in all different probability levels for the studied products in Goutvand , Aghili, and Dimche areas, except for beans in the Gatund area, was estimated to be lower than the average environmental efficiency. This shows the lack of ability and skill of farmers to produce a certain product with the lowest amount of input, while the farmers of these areas pay great attention and care to environmental issues.

Keywords: Khuzestan, Operational efficiency, Robust data envelopment analysis, Undesirable output, Undesirable input

مقاله پژوهشی

جلد ۳۷، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۲، ص ۲۸۷-۲۷۱

تعیین کارایی محیط‌زیستی محصولات عمده زراعی مناطق منتخب استان خوزستان

مصطفی مردانی نجف آبادی^{۱*} - عباس عبدشاهی^۲ - الهه آهنی^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

چکیده

تجزیه و تحلیل نظام‌های کشاورزی به منظور تعیین کارایی و بررسی اثرات محیط زیستی-اقتصادی، موجب ارتقاء کیفی مدیریت و توسعه پایدار کشاورزی می‌گردد. توسعه پایدار بخش کشاورزی از اولویت‌های مهم مورد توجه کشورها بوده و نقش و اهمیت کارایی محیط‌زیستی همواره مورد تأکید بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر با توجه به مزیت نسبی اقتصادی استان خوزستان و با هدف تعیین کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی، کارایی عملیاتی و کارایی محیط‌زیستی محصولات عمده زراعی با استفاده از تلفیق مدل بهینه‌سازی با پارامترهای کنترل‌کننده میزان محافظه‌کاری و تحلیل پوششی داده‌ها انجام گرفت. داده‌های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه استان خوزستان و با روش نمونه‌گیری تصادفی در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد، یونجه‌کاران منطقه گتوند با کسب امتیاز در محدوده ۸۱-۸۹ و ۹۶-۹۰ درصد به ترتیب بالاترین میزان کارایی محیط‌زیستی و محیط‌زیستی-اقتصادی را به خود اختصاص دادند. در منطقه عقیلی، محصول برنج بالاترین میزان کارایی عملیاتی به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف در محدوده ۸۷-۷۷ درصد، کارایی محیط‌زیستی در محدوده ۹۰-۸۰ درصد و کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی در محدوده ۹۵-۸۷ درصد را کسب نمود. در منطقه دیمچه، محصول نیشکر بالاترین میانگین انواع کارایی را به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف با کسب امتیازات در محدوده ۷۸ تا ۹۰، ۸۰ تا ۸۹ و ۸۷ تا ۹۵ به ترتیب برای کارایی عملیاتی، محیط‌زیستی و محیط‌زیستی-اقتصادی را به خود اختصاص داد. به طور کلی، میانگین کارایی عملیاتی در همه سطوح احتمال برای محصولات مورد بررسی در مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه به استثنای (لوبیا در منطقه گتوند)، کمتر از میانگین کارایی محیط‌زیستی برآورد گردید. این امر، بیانگر عدم قابلیت‌ها و مهارت‌های کشاورزان در به کارگیری میزان مناسب نهاده‌ها جهت تولید محصولات کشاورزی بوده، در حالی که کشاورزان مناطق مورد بررسی، بر مسائل محیط‌زیستی تمرکز بیشتری دارند. لذا پیشنهاد می‌شود در زمینه به کارگیری مناسب نهاده‌های تولید، آموزش‌های ترویجی صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: تحلیل پوششی داده‌های استوار، خوزستان، ستاده نامطلوب، کارایی عملیاتی، نهاده نامطلوب

مقدمه

در نتیجه، تعادل و توازن اکولوژیکی را به دنبال خواهد داشت Kazemi (2016; Besharatdeh et al., 2019). همچنین اقتصاد و محیط‌زیست از طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند. از یک سو، منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر از محیط‌زیست به سوی اقتصاد انتقال می‌یابند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای محصولاتی که به وسیله فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به

ارتباط بین توسعه اقتصادی و محیط‌زیست از جمله مهمترین مسائل پیش‌رو در جوامع شناخته شده است. چنانچه در بستر توسعه پایدار، فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی به صورت توأمان در نظر گرفته شود، محیط‌زیست و توسعه اقتصادی دو عامل مکمل یکدیگر بوده و

۱ و ۲- دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
* - نویسنده مسئول: (Email: m.mardani@asnruckh.ac.ir)

۳- مدرس گروه حسابداری و اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات و تربت حیدریه


کنترل‌کننده میزان محافظه‌کاری و تحلیل پوششی داده‌ها برای محصولات زراعی مناطق گتوند، دیمچه و عقیلی استفاده گردید.

هرچند در زمینه بررسی و ارزیابی شاخص کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی در تولید محصولات کشاورزی، پژوهش‌های مختلفی انجام گرفته، اما تنها معدودی از مطالعات به برآورد کارایی محیط‌زیستی مبادرت نموده‌اند (Nabavi-Pelesaraei et al., 2016; Mardani and Taki, 2020). در پژوهشی به‌منظور بهینه‌سازی انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گندم، میزان بهینه انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گندم در شهر اهواز را ۳۴۰ کیلوگرم در هکتار محاسبه نمودند. (Karimi et al., 2012) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها به تعیین کارایی تولید گندم در ۸ استان بزرگ کشور پرداختند. برای اعمال شرایط عدم اطمینان در داده‌های ورودی و خروجی، از روش تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای (IDEA) استفاده گردید. (Mardani et al., 2011) کارایی مزارع گندم سیستان را با استفاده از روش تلفیق مدل بهینه‌سازی با پارامترهای کنترل‌کننده (RDEA) برآورد کردند. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کارایی مزارع نمونه در مدل پیشنهادی، در سطح ثابت عدم اطمینان معین و با افزایش میزان احتمال هر محدودیت از کران خود (P)، کاهش می‌یابد. در پژوهشی دیگر، ماسودا (Masuda, 2016) بررسی کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی تولید گندم در ژاپن نشان داد که کاهش آفت‌های گندم ناشی از استفاده بیش از حد کود نیتروژن عامل مهمی در کارایی اقتصادی تولید گندم و در نتیجه توسعه کشت پایدار گندم در ژاپن بود. به‌عبارتی، در فرآیند تولید در کنار محصول خوب (ستاده مطلوب)، محصول بد (ستاده نامطلوب) نظیر نیتروژن، فسفر و سایر آلاینده‌ها تولید می‌شود. فورلئو و همکاران (Forleo et al., 2018) با استفاده از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری اثر محیط‌زیستی، به اندازه‌گیری کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی کلزا و آفتابگردان برای یک مگاژول از زیست‌توده به‌عنوان ارزش‌افزوده مبادرت نمودند. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی مزارع آفتابگردان بیشتر از کلزا بود. در پژوهشی دیگر، اوزالپ و همکاران (Ozalp et al., 2018) متوسط مقدار کربن دی‌اکسید منتشر شده در تولید انار در آنتالیای ترکیه ۸۸/۱ کیلوگرم کربن دی‌اکسید در هکتار در تولید انار گزارش شد که نهاده‌های الکتریسیته و کودهای شیمیایی بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشتند. در حال حاضر، توجه به محیط‌زیست، یکی از مؤلفه‌های اصلی در سیاست‌های کلان جهانی بوده که بسیاری از مؤلفه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، مهمترین عامل و پیش‌نیاز بسیاری از فعالیت‌ها در سطح کلان، سازگاری با محیط‌زیست است (Beshartadeh et al., 2021). بنابراین هدف پژوهشگران در این زمینه، کمینه کردن یا حذف پیامدهای جانبی منفی برای دستیابی

محیط‌زیست هستند. زمانی که جریان مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی تجاوز نماید، ظرفیت منابع طبیعی و محیط‌زیست کاهش می‌یابد. جریان سریع منابع پایان‌پذیر به درون چرخه اقتصادی می‌تواند به تخلیه سریع ذخیره این دسته از منابع منجر شود (Barghi et al., 2016; Mardani Najafabadi et al., 2020). هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیز به‌سوی چرخه اقتصادی، از نرخ تجدیدپذیری و احیای این منابع تجاوز کند، باعث کاهش بهره‌وری منابع شده و احتمال نابودی آن‌ها افزایش می‌یابد. از این‌رو، لزوم رسیدن به سود بیشتر در کنار اهمیت به مسائل محیط‌زیستی و توسعه پایدار سبب شده است تا ضمن تعریف مفهوم کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی و محیط‌زیستی، استفاده از آن به‌عنوان شاخص مناسبی به‌منظور ارزیابی پایداری نظام‌های تولید کشاورزی مورد توجه قرار گیرد (Boucekkine et al., 2011).

به‌دلیل اینکه بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط‌زیست دارا بوده و همچنین بخش عمده‌ای از آلودگی‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد، لذا تکنولوژی‌های نوین دامنه اثرات منفی کشاورزی بر محیط‌زیست را کاهش داده‌اند (Taate et al., 2013). مطابق آمار سازمان محیط‌زیست، در سال ۱۳۹۸ ایران رتبه ۱۱۶ را در مصرف کود شیمیایی در بین کشورهای جهان به‌خود اختصاص داده است. در ایران به‌ازای هر هکتار زمین کشاورزی، ۸۹ کیلوگرم کود شیمیایی مصرف می‌شود. در حالی که، میانگین جهانی مصرف کود شیمیایی ۱۰۱ کیلوگرم در هکتار است (Department of Environment, 2019). همچنین، طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، میزان مصرف سموم شیمیایی از ۱۹۳ هزار لیتر در سال ۱۳۹۹ به ۳۸۳ هزار لیتر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیایی، علاوه بر افزایش فرسایش خاک و آلودگی منابع آب، کیفیت محصولات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در استان خوزستان، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در محدوده رودخانه‌های دز و کارون و در بخش جلگه‌ای منطقه که از دیرباز به‌عنوان قطب بزرگ کشاورزی در کشور مطرح بوده، واقع شده است. گستردگی حجم فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه، بر حجم بار آلودگی آب و خاک این منطقه افزوده است (Hossenli Zare et al., 2016). با توجه به این موارد و از آن‌جا که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی در اراضی تحت پوشش آبیاری و زهکشی گتوند در سال ۹۹-۱۳۹۸، حدود ۳/۶ برابر متوسط مصرف نهاده‌ها در ایران است (Reports of program organization, 2016)، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی عملیاتی، محیط‌زیستی و محیط‌زیستی-اقتصادی محصولات عمده اراضی پایاب شبکه‌های آبیاری و زهکشی گتوند انجام شده است. برای این منظور، از تلفیق مدل‌های بهینه‌سازی با پارامترهای

تعبیه شده به رودخانه‌ها بازگشته و باعث آلوده شدن آب در پایین دست شبکه می‌گردد ([Reports of program organization, 2016](#)). از این رو، با توجه به اینکه حفاظت از محیط‌زیست از جمله مهمترین ابعاد توسعه پایدار است، لذا بررسی آثار ناشی از کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و معرفی راهکارهایی به منظور بهبود کارایی محیط‌زیست در منطقه مورد مطالعه، جزو ضروری‌ترین مسائل در منطقه مطرح گردیده است.



شکل ۱- شماتیک کلی شبکه آبیاری و زهکشی گتوند
Figure 1- General schematic of irrigation and drainage network of Gotvand

از آن‌جا که فعالیت‌های کشاورزی در شرایط نامطمئن محیط‌زیستی انجام می‌شود، لذا در رابطه با نهاده‌ها و ستاده‌ها عدم قطعیت‌هایی وجود دارد. عدم قطعیت موجود در برخی از داده‌ها به‌عنوان نهاده و ستاده مؤثر در رتبه‌بندی مدل‌ها و دقیق نبودن نتایج حاصل از محاسبه مدل، ضرورت به کارگیری عدم قطعیت را در بخش کشاورزی آشکارتر می‌سازد. از این رو، در مطالعه حاضر به‌منظور لحاظ شرایط عدم قطعیت، از مدل تحلیل پوششی داده‌های استوار (RDEA) که یکی از مدل‌های بسیار قوی و مفید در شرایط عدم حتمیت است، بهره گرفته شد. ادغام مدل‌های برنامه‌ریزی استوار با مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها، یکی از مهمترین روش‌های اعمال شرایط عدم حتمیت جهت دستیابی به نمرات کارایی پایدار و رتبه‌بندی قابل اطمینان بوده که مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است (Ohadi et al., 2020). از جمله مزایای کاربرد این روش، می‌توان به دستیابی به نتایج بهینه نقطه‌ای بدون نیاز به آگاهی از توزیع داده‌ها اشاره کرد.

تحلیل پوششی داده‌های استوار (RDEA)

به محیط‌زیست پاک برای نسل‌های آینده با هدف افزایش بهره‌وری و کارایی با استفاده از فناوری‌های نوین می‌باشد (Nikkhah et al., 2015). در بخش کشاورزی، کودها و سموم شیمیایی مهمترین نهاده‌هایی هستند که در صورت مدیریت نامناسب مصرف آن‌ها، آلودگی زیست‌محیطی در بخش کشاورزی را به دنبال دارند. بررسی مطالعات گذشته، نشان داد که در اکثر آن‌ها، اثر ستاده نامطلوب در کنار ستاده مطلوب محاسبه شده است. در مطالعه حاضر، با رویکردی متفاوت از سایر مطالعات انجام شده، نهاده‌های نامطلوب (کود، سموم شیمیایی و غیره) در کنار نهاده‌های مطلوب (مانند، آب، نیروی کار و غیره) در برآورد کارایی محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفت. قابل ذکر است که به‌کارگیری کودها و سموم شیمیایی را نمی‌توان تماماً نهاده نامطلوب تلقی نمود. این نهاده‌ها فقط در صورتی که منجر به افزایش خروجی‌های نامطلوبی چون نیترات و غیره شوند، تماماً نامطلوب به شمار می‌روند.

مواد و روش‌ها

در این بخش ابتدا به معرفی منطقه مورد مطالعه پرداخته می‌شود. سپس مدل تحلیل پوششی داده‌های استوار که برای اعمال شرایط عدم اطمینان بکار می‌رود، معرفی شده است. بعد از آن، مدل اصلی DEA که برای تفکیک کارایی عملیاتی و زیست‌محیطی است معرفی می‌گردد. در نهایت، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری معرفی شده است.

شبکه آبیاری و زهکشی گتوند در جنوب غربی ایران در استان خوزستان واقع شده است. این شبکه، جهت آبیاری اراضی واقع در سه منطقه گتوند، عقیلی و دیمچه، محصور بین دو رودخانه کارون و لور طراحی گردیده است (شکل ۱). کل اراضی تحت پوشش این شبکه ۴۳۹۳۰ هکتار بوده و به‌طور خالص، ۳۴۱۴۴ هکتار در بیش از ۴۳۰۰ قطعه زمین از آن استفاده می‌کنند (Agricultural, 2019). مناطق گتوند و عقیلی آب آبیاری مورد نیاز خود را از سد گتوند که روی رودخانه کارون احداث گردیده، دریافت می‌نمایند. بیشترین میزان زیرساخت این شبکه آبیاری و زهکشی، در منطقه دیمچه واقع است. منطقه دیمچه علاوه بر سد گتوند، به‌طور مستقیم توسط چند سد انحرافی از رودخانه لور که انشعابی از رودخانه دز است نیز تغذیه می‌نماید ([Reports of program organization, 2016](#)).

براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی در اراضی تحت پوشش آبیاری و زهکشی گتوند در سال ۹۹-۱۳۹۸ معادل ۳/۶ برابر متوسط مصرف نهاده‌ها در ایران است ([Reports of program organization, 2016](#)). بنابراین، مازاد آب‌آبیاری در این شبکه توسط زهکش‌های

که Z ، y و P متغیرهای اضافی غیرمنفی برای لحاظ عدم حتمیت در مدل هستند. در مدل بهینه‌سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه‌کاری، دو جمله اضافی نسبت به حالت استاندارد برنامه‌ریزی خطی وجود دارد $(Z_i \Gamma_i + \sum_{r=1}^s P_{rj})$. شایان ذکر است که محاسبه پارامتر Γ_i براساس سطح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود و تعداد منابع عدم حتمیت در این محدودیت محاسبه می‌شود (Mardani, Najafabadi and Abdshahe, 2018).

رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) یکی از مهمترین روش‌های ناپارامتریک است که با کمک برنامه‌ریزی خطی به تعیین کارایی آن دسته از واحدهای تصمیم‌گیر که دارای ستانده‌ها و نهاده‌های مشابهی هستند، می‌پردازد و هیچگونه فرض اولیه‌ای مبنی بر ارتباط تبعی بین نهاده‌ها و ستانده‌ها را در نظر نمی‌گیرد. از آن‌جا که تمام ارقام و اطلاعات پوشش می‌دهد، به آن تحلیل فراگیر داده‌ها اطلاق می‌شود. مبدأ این روش به مطالعه فارل در سال ۱۹۵۷ بر می‌گردد و بر اساس رهیافت فارل، (Charles and Cooper, 1962) اولین مدل برنامه‌ریزی خطی DEA برای محاسبه کارایی با بازده ثابت نسبت به مقیاس را توسعه داد (Besharatdeh et al., 2019).

مدل‌های سنتی DEA در صورت وجود متغیرهای مهمی که تأثیری منفی بر محیط‌زیست دارند، قادر به ارائه نتایج دقیقی نیستند. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان با بهره‌گیری از آن به طور همزمان، کارایی عملیاتی و محیط‌زیستی را اندازه‌گیری نمود، کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی است که برای اندازه‌گیری آن از مدل DEA اصلاح شده بهره گرفته می‌شود.

کارایی عملیاتی

کارایی عملیاتی بر اساس نسبت خروجی‌ها به ورودی‌ها در یک سیستم محاسبه می‌شود. بنابراین با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس CRS و با وجود ورودی‌های عملیاتی x_{ij} ($i = 1, \dots, m$) و خروجی y_{rj} ($r = 1, \dots, s$) برای هر واحد تصمیم‌گیرنده^۲ یا به عبارتی DMU $_j$ ($j = 1, \dots, n$) کارایی عملیاتی از طریق رابطه (۳) محاسبه می‌شود (Charles and Cooper, 1962).

با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیر که ارزش نهاده‌ها و ستانده‌های مبهم آن‌ها به ترتیب با مجموعه‌های J_j^x و J_j^y نشان داده می‌شود، می‌توان پارامترهای γ_j^x و γ_j^y را به گونه‌ای تعریف نمود که بتوانند مقادیری را در فواصل محدود $[0, J_j^x]$ و $[0, J_j^y]$ اختیار نمایند. این پارامترها از این جهت که مدل DEA را در برابر تغییرات ناشی از شرایط عدم حتمیت در داده‌های ورودی و خروجی استوار می‌سازند، دارای اهمیت هستند. مدل عمومی RDEA در رابطه (۱) ارائه شده است (Shokouhi et al., 2010).

$$\begin{aligned} \max \quad & \theta_p = \sum_{r=1}^s u_r y_{rp}^U - \beta_p^y, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m v_i x_{ip}^L + \beta_p^x = 1 \\ & \sum_{r=1}^s u_r y_{rj}^L - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^U + \beta_j^y + \beta_j^x \leq 0, \quad \forall j \neq p, \\ & \theta_p \leq 1, \end{aligned} \quad (1)$$

که دو متغیر $\beta_j^x(x, \gamma_j^x)$ و $\beta_j^y(y, \gamma_j^y)$ جهت اعمال شرایط عدم اطمینان در مدل DEA مورد استفاده قرار گرفته‌اند (Despotis et al., 2006). همچنین، θ بیانگر مقیاس کارایی، y_{rj} مقدار خروجی (محصول) کنترل شده r برای واحد زراعی j و x_{ij} مقدار ورودی (نهاده) کنترل شده i در واحد زراعی j می‌باشد. مدل نهایی RDEA در رابطه ۲ آمده است.

$$\begin{aligned} \max \quad & \theta_p = \sum_{r=1}^s u_r y_{rp}^U - z_p \gamma_p^y - \sum_{r=1}^s p_r, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m v_i x_{ip}^L + z_p \gamma_p^x - \sum_{r=1}^s q_{rp} = 1 \\ & \sum_{r=1}^s u_r y_{rj}^L - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^U + z_j \gamma_j^y + \sum_{r=1}^s p_r + \sum_{r=1}^m q_{rj} \leq 0 \quad \forall j \neq p, \\ & z_j + p_j \geq u_r (y_{rj}^U - \gamma_j^y), \quad \forall r, j \\ & z_j + q_{ij} \geq v_i (x_{ij}^U - \gamma_j^x), \quad \forall i, j \\ & \theta_p \leq 1, \\ & v_i, u_r \geq \varepsilon, \quad \forall i, r \\ & z_j, q_{ij}, p_j \geq 0, \quad \forall i, j, r \end{aligned}$$

(۲)

محیط‌زیستی است. ارتقا و بهبود کارایی اقتصادی نیز بهبود منابع مالی یا درآمد خالص برای بهبود کیفیت محیط‌زیست را به دنبال دارد (Forleo et al., 2018). در این راستا، شاخص کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی در تولید محصولات کشاورزی به عنوان مناسب‌ترین شاخص برای ارزیابی پایداری تولید محصولات مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص از طریق نسبت مجموع وزنی خروجی‌ها به مجموع وزنی ورودی‌ها (ورودی‌های عملیاتی + ورودی‌های محیط‌زیستی) براساس رابطه (۵) محاسبه گردید. δ بیانگر درجه حساسیت محیط‌زیستی بوده و هر چه مقدار آن کوچکتر باشد، نشان‌دهنده بهتر بودن کارایی عملیاتی است. در مقابل، هر چه δ بزرگتر باشد، دلالت بر حساسیت بیشتر نسبت به محیط‌زیست است. مقدار اولیه این پارامتر بسته به حساسیت تصمیم‌گیرندگان نسبت به مسایل زیست‌محیطی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، این پارامتر یک موازنه بین حساسیت این تصمیم‌گیران نسبت به موازنه کارایی زیست‌محیطی و عملیاتی ایجاد می‌نماید. البته می‌توان در مدل‌های دارای عدم اطمینان این پارامتر را طوری در نظر گرفت که سهم یکسانی (مقدار ۰/۵) برای هر دو نوع کارایی مد نظر قرار دهد و به عنوان یک منبع عدم اطمینان لحاظ نمود (Han et al., 2015). به این طریق می‌توان یک تحلیل حساسیت از به صورت ضمنی ایجاد کرد. در مطالعه حاضر نیز با این علت که مدل RDEA مورد کاربرد قرار گرفته است، این مورد بکار گرفته شده است. با افزودن این محدودیت به مدل اصلی، می‌توان شدت آلودگی را به صورت متوالی در نظر گرفت. بنابراین، این محدودیت‌ها به عنوان محدودیت‌های دقیق محیط‌زیستی بیان می‌شوند.

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{ro} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} - \delta \sum_{k=1}^p w_k z_{kj} \leq 0 \\ & \sum_{i=1}^m v_i x_{i0} + \delta \sum_{k=1}^p w_k z_{k0} = 1 \\ & v_i \geq 0 \\ & u_r \geq 0 \\ & w_k \geq 0 \end{aligned} \quad (5)$$

جامعه‌ی آماری مورد مطالعه کشاورزان مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه در استان خوزستان که بیشترین سطح زیرکشت هر محصول را دارا بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از بین کشاورزان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب برای هر منطقه در سال ۹۹-۱۳۹۸ جمع‌آوری گردید. به عبارت دیگر، با توجه به مشخص بودن هر منطقه

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{ro} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \leq 0 \\ & \sum_{i=1}^m v_i x_{i0} = 1 \\ & v_i \geq 0 \\ & u_r \geq 0 \end{aligned} \quad (3)$$

اگر در رابطه بالا مقدار بهینه برابر با یک باشد، واحد تحت بررسی کاملا کارا و روی مرز کارایی قرار دارد.

کارایی محیط‌زیستی

کارایی محیط‌زیستی و محیط‌زیستی-اقتصادی به معنی افزایش ستاده با مصرف بهینه نهاده می‌باشد. به عبارتی، کارایی محیط‌زیستی و محیط‌زیستی-اقتصادی بیانگر استفاده بهینه از منابع، هزینه‌ها و در نهایت، کاهش اثرات محیط‌زیستی می‌باشد. چنانچه فعالیت‌های اقتصادی از کارایی محیط‌زیستی لازم برخوردار نباشند، دستیابی به توسعه پایدار با مشکل مواجه خواهد شد (Kazemi et al., 2016). به طور کلی، کارایی محیط‌زیستی ملاک سنجش کارایی تولید است. کارایی زیست‌محیطی بر اساس نسبت خروجی‌ها به ورودی‌های زیست‌محیطی محاسبه می‌شود (Lertworasirikul et al., 2003). اگر فرض شود p ورودی محیط‌زیستی z_{kj} ($k = 1, \dots, p$)، برای هر DMU_j ($j = 1, \dots, n$) وجود دارد. کارایی محیط‌زیستی بر اساس رابطه (۴) محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{ro} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{k=1}^p w_k z_{kj} \leq 0 \\ & \sum_{k=1}^p w_k z_{k0} = 1 \\ & w_k \geq 0 \\ & u_r \geq 0 \end{aligned} \quad (4)$$

کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی

کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی دربرگیرنده کارایی عملیاتی و

نیاز برای مدل RDEA تنظیم شد. متغیرهای مورد استفاده در محاسبه کارایی عملیاتی و کارایی محیط‌زیستی در جدول ۱ آمده‌اند. قابل ذکر است که نهاده انرژی و خروجی نامطلوب انتشار گاز CO₂، از طریق انجام محاسبات معادل این متغیرهای حاصل خواهند شد (Mardani, Najafabadi and Abdeshahe, 2018).

و همچنین نیاز به نمونه جداگانه، برای هر منطقه به صورت جداگانه از فرمول کوکران استفاده شد. محصولات مورد بررسی در منطقه گتوند شامل یونجه، لوبیا، باقلا، برنج، سبزیجات و گندم در منطقه عقیلی محصولات برنج، سبزیجات، گندم و در منطقه دیمچه ذرت، نیشکر و گندم بودند.

نوع سوالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای ورودی و خروجی مورد

جدول ۱- تجزیه متغیرهای ورودی در اندازه‌گیری کارایی محیط‌زیستی-اقتصادی

Table 1- Analysis of input variables in measuring environmental-economic efficiency

نبروی کار، ماشین آلات، آب، بذر Labor, machinery, water, seeds	نهادهای سنتی Traditional inputs	کارایی عملیاتی Operational efficiency
سوخت دیزلی، انرژی الکتریکی Diesel fuel, electrical energy	نهادهای انرژی‌زا Energy inputs	
پتاس، نیتروژن، فسفات Potash, nitrogen, phosphate	کود Fertilizer	
علف‌کش، حشره‌کش، قارچ‌کش Herbicide, insecticide, fungicide	سموم Pesticides	
انتشار گاز CO ₂ CO ₂ emissions		کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency
	خروجی نامطلوب (انتشار مستقیم گازهای گلخانه‌ای) Undesirable output (direct emission of greenhouse gases)	

ماخذ: یافته‌های تحقیق

Source: Research findings

بر اساس نتایج جدول ۳، در منطقه عقیلی، سبزیجات بیشترین میزان متوسط مصرف نهاده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. به طوری که، میانگین مصرف آب ۹۴۲۱ متر مکعب در هکتار، انرژی الکتریکی ۲۷۴۰ کیلووات ساعت در هکتار، پتاس ۶۲ کیلوگرم در هکتار، فسفات ۱۴۹ کیلوگرم در هکتار و انتشار گاز دی اکسید کربن معادل ۳۹۳۷۴ کیلوگرم در هکتار برآورد است. همچنین گندم با میانگین مصرف ۲۹ نفر نیروی کار، ۱۲۲ لیتر در هکتار سوخت دیزل، ۹۵ کیلوگرم بذر در هکتار ۴۴۸ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و ۱ لیتر در هکتار علف‌کش، بیشترین میانگین در مصرف این دسته از نهاده‌ها را دارد. محصول برنج با میانگین مصرف علف‌کش، حشره‌کش و قارچ‌کش به ترتیب برابر با ۱، ۰/۶۷ و ۰/۶۲ لیتر در هکتار بیشترین میانگین مصرف سموم شیمیایی را به خود اختصاص داده است. به طور کلی، لازم است که در کشت این محصولات با توجه کارایی محیط‌زیستی و اقتصادی بودن محصول به لحاظ صرف هزینه، تجدید نظر شود. در منطقه عقیلی، محصول برنج در بین سایر محصولات از کارایی محیط‌زیستی مطلوبی برخوردار نبود. به عبارت دیگر، میزان ستاده نامطلوب محصول برنج در این منطقه نسبت به سایر محصولات بیشتر بوده و نشان‌دهنده افزایش کارایی عملیاتی نسبت به کارایی محیط‌زیستی می‌باشد.

نتایج و بحث

با توجه به نتایج به دست آمده از توصیف آماری متغیرهای در جدول ۲، ملاحظه می‌گردد که در منطقه گتوند از بین محصولات مورد مطالعه، بیشترین مصرف نهاده آب با ۱۲۷۹۳ متر مکعب در هکتار و نیروی کار با ۵۸ نفر به محصول یونجه اختصاص دارد. از نظر مصرف کودهای شیمیایی، سبزیجات با میانگین مصرف ۶۳ کیلوگرم پتاس در هکتار، گندم با میانگین مصرف ۴۵۲ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و یونجه با مصرف متوسط ۲۴۱ کیلوگرم فسفات در هکتار، بیشترین میزان مصرف کود شیمیایی را دارا هستند. برنج با مصرف متوسط ۱، ۰/۶۸ و ۰/۵۳ لیتر در هکتار به ترتیب برای علف‌کش، حشره‌کش و قارچ‌کش، بالاترین مقدار مصرف سموم شیمیایی را داراست. سبزیجات با انتشار ۳۹۶۸۵ کیلوگرم گاز CO₂ در هکتار، بالاترین مقدار انتشار ستانده نامطلوب را در بین محصولات مختلف به خود اختصاص داده است. اگرچه سبزیجات بیشترین میزان آلودگی خاک و آب را در بین محصولات دارا بودند، اما از مزایای کشت آن‌ها این است که CO₂ هوا را جذب نموده و در فرآیند ترسیب کربن نیز نقش اساسی ایفا می‌نمایند. به این دلیل، توجیه قطعی بر نامطلوب بودن این ستاده نیست. به عبارتی، با توجه به هدف مطالعه، ستاده نامطلوب از جنبه‌ای دیگر می‌تواند ستاده مطلوب به شمار رود.

جدول ۲- توصیف آماری متغیرهای مطالعه در منطقه گتوند
Table 2- Statistical description of study variables in the Goutvand region

محصول Product	آماره Statistics	گاز CO ₂ CO ₂ gas (kg)	فانجیکس Fungicide (liter)	حشره کش Nsecticide (liter)	علف کش Herbicide (liter)	فسفات Phosphate (kg)	نیتروژن Nitrogen (kg)	پتاس Potassium (kg)	بذر Seeds (kg)	انرژی الکتریکی Electric energy (kWh)	سوخت دیزلی Diesel fuel (liters)	نیروی کار Labor (people)	ماشین آلات Machinery (hours)	آب Water (cubic meter)
یونجه Alfalfa	حداکثر Max	28698	0.1	0.98	0.97	424	29	29	129	2838	40	83	51	18274
	حداقل Min	20249	0	0	0	74	6	6	50	0	10	33	19	7590
	میانگین Average	24297	0.05	0.44	0.55	241	17	17	90	1199	24	58	36	12793
	انحراف معیار Standard deviation	2602	0.03	0.3	0.27	112	7	7	23	998	9	16	10	3233
لوبیا Beans	حداکثر Max	17755	0	0.01	0	202	305	0	120	4824	50	50	48	9540
	حداقل Min	11025	0	0	0	95	127	0	41	0	10	25	30	6337
	میانگین Average	14416	0	0.004	0	147	214	0	81	2537	31	38	40	7946
	انحراف معیار Standard deviation	1982	0	0.002	0	33	56	0	24	1304	13	8	5	1036
باقلا Beans	حداکثر Max	21523	0.1	0.01	0	78	41	82	90	2783	40	39	46	7918
	حداقل Min	15097	0.005	0	0	42	12	12	40	0	10	19	19	7924
	میانگین Average	18218	0.05	0.005	0	60	26	50	64	1179	25	29	28	4589
	انحراف معیار Standard deviation	1840	0.03	0.003	0	11	9	22	16	964	9	6	6	6158
برنج Rice	حداکثر Max	41669	2	2	2	138	586	12	121	4838	80	31	48	9467
	حداقل Min	26294	0	0	0.01	77	287	5	41	0	20	16	12	6771
	میانگین Average	34192	0.053	0.68	1	108	443	9	81	2652	49	24	29	8114
	انحراف معیار Standard deviation	4587	0.62	0.67	0.6	19	85	2	22	1178	17	5	11	768
سبزیجات Vegetale	حداکثر Max	45766	0.1	0.01	1	205	444	82	30	4838	120	39	39	11492
	حداقل Min	33033	0.001	0	0	96	253	44	10	0	50	19	19	7264
	میانگین Average	39685	0.05	0.005	0.59	150	355	63	20	2584	89	29	30	9191
	انحراف معیار Standard	3745	0.03	0.003	0/50	31	50	12	6	1407	21	6	6	1320

		deviation												
گندم Wheat	حداکثر Max	32729	0.5	0.99	2	138	588	12	121	3637	196	19	38	5461
	حداقل Min	19012	0.01	0	0.01	76	288	5	67	979	47	6	21	3774
	میانگین Average	25995	0.26	0.49	0.91	109	452	8	93	2319	126	12	29	4643
	انحراف معیار Standard deviation	4111	0.14	0.29	0.57	17	85	2	16	802	47	4	5	488

مأخذ: یافته‌های تحقیق

Source: Research findings

جدول ۳- توصیف آماری متغیرهای مطالعه در منطقه عقیلی
Table 3- Statistical description of study variables in the Aghili region

محصول Product	آماره Statistics	گاز CO ₂ CO ₂ gas (kg)	قارچ کش Fungicide (liter)	حشره کش Insecticide (liter)	علف کش Herbicide (liter)	فسفات Phosphate (kg)	نیترژن Nitrogen (kg)	پتاسی Potassium (kg)	بذر Seeds (kg)	انرژی الکتریکی Electric energy (kWh)	سوخت دیزلی Diesel fuel (liters)	نیروی کار Labor (people)	ماشین آلات Machinery (hours)	آب Water (cubic meter)
برنج Rice	حداکثر Max	41767	2	2	2	138	586	12	121	4820	79	31	48	9476
	حداقل Min	26028	0	0	0/1	76	290	5	41	0	20	16	12	6775
	میانگین Average	33717	0.62	0.67	1	108	444	9	86	2649	49	24	29	8035
	انحراف معیار Standard deviation	4833	0.62	0.67	0/58	18	87	2	22	1360	17	4	10	822
سبزیجات Vegetable	حداکثر Max	45585	0.1	0.01	1.1	203	443	82	30	4864	120	39	39	11531
	حداقل Min	32985	0.001	0	0	95	251	43	10	0	50	19	19	7286
	میانگین Average	39374	0.05	0.005	0.47	149	347	62	20	2740	83	29	29	9421
	انحراف معیار Standard deviation	3519	0.03	0.003	0.5	31	57	12	6	1398	19	6	6	1221
گندم Wheat	حداکثر Max	32680	0.49	1	2	138	587	12	121	3639	198	19	38	5439
	حداقل Min	19035	0	0.01	0.02	76	287	5	68	1013	46	6	21	3770
	میانگین Average	25895	0.24	0.49	1	109	448	7	95	2299	122	13	30	4560
	انحراف معیار Standard deviation	3779	0.13	0.28	0.58	18	87.9	2.3	15	748	47	47	5	506

مأخذ: یافته‌های تحقیق

Source: Research findings

جدول ۴- توصیف آماری متغیرهای مطالعه در منطقه دیمچه
Table 4- Statistical description of study variables in the Dimche region

محصول Product	آماره Statistics	گاز CO ₂ CO ₂ gas (kg)	قارچ‌کش Fungicide (liter)	حشره‌کش Insecticide (liter)	علف‌کش Herbicide (liter)	فسفات Phosphate (kg)	نیترژن Nitrogen (kg)	پتاس potassium (kg)	بذر Seeds (kg)	انرژی الکتریکی Electric energy (kWh) Electric energy (kWh)	سوخت دیزلی Diesel fuel (liters)	نیروی کار Labor (people)	ماشین‌آلات Machinery (hours)	آب Water (cubic meter)
ذرت Maize	حداکثر Max	48662	1	1	0.96	150	80	12	200	2834	89	50	109	18443
	حداقل Min	20066	0.004	0.01	0.03	72	21	5	81	0	10	32	30	7447
	میانگین Average	33862	0.49	0.46	0.5	108	51	8	135	1219	45	42	69	12677
	انحراف Standard deviation	8189	0.27	0.3	0.29	24	17	2	33	989	23	6	24	33921
	معیار													
نیشکر Sugar cane	حداکثر Max	95557	2	1	4	891	700	82	30	4860	120	39	80	11511
	حداقل Min	33012	0.01	0.01	0.04	98	251	43	10	0	50	19	19	7334
	میانگین Average	62211	1	0.52	2	498	479	62	20	2563	83	28	48	9488
	انحراف Standard deviation	17019	0.58	0.29	0.96	235	136	12	6	1316	21	6	18	1283
	معیار													
گندم Wheat	حداکثر Max	62594	0.49	0.99	2	138	588	12	121	3646	196	19	38	5479
	حداقل Min	29015	0.01	0	0.05	76	288	5	67	1035	46	6	21	3768
	میانگین Average	47222	0.24	0.46	1	107	437	8	95	2301	106	13	30	4646
	انحراف Standard deviation	10185	0.14	0.29	0.58	18	91	2	17	804	45	4	6	497
	معیار													

مأخذ: یافته‌های تحقیق

Source: Research findings

یک نهاده نامطلوب تبدیل خواهد شد.

برآورد کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی

پس از بررسی اولیه داده‌های ورودی و خروجی و تفکیک آن‌ها به نهاده‌های مطلوب و نامطلوب، به محاسبه مدل RDEA و تحلیل کارایی حاصل از اجرای این مدل پرداخته شد. به طوری که، با در نظر گرفتن نهاده‌های مطلوب شامل آب، نیروی کار، سوخت و سایر عوامل، کارایی عملیاتی برآورد گردید. سپس با در نظر گرفتن نهاده‌های نامطلوب از جمله کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی و خروجی

توصیف آماری متغیرهای منطقه دیمچه در جدول ۴ نشان داد که ذرت با متوسط مصرف ۱۲۶۷۷ متر مکعب آب در هکتار، ۶۹ ساعت ماشین‌آلات در هکتار، ۴۲ نفر نیروی کار و ۱۳۵ کیلوگرم در هکتار بذر و نیشکر با متوسط مصرف ۲۵۶۳ کیلووات ساعت در هکتار انرژی الکتریکی، ۶۲ کیلوگرم در هکتار پتاس، ۴۷۹ کیلوگرم در هکتار نیترژن، ۴۹۸ کیلوگرم در هکتار فسفات، ۰/۵۲ لیتر در هکتار علف‌کش، ۱ لیتر در هکتار قارچ‌کش و انتشار ۶۲۲۱۱ کیلوگرم در هکتار گاز دی اکسید کربن، بیشترین میانگین در مصرف این دسته از نهاده‌ها را دارا می‌باشند. به طور کلی، هر نهاده‌ای که به میزان بهینه استفاده نشود به

مطابق نتایج جدول ۶، برآورد متوسط کارایی در منطقه عقیلی نشان داد که بیشترین و کمترین میزان کارایی به ترتیب متعلق به محصول برنج و گندم بوده است. به طوری که، برای محصول برنج به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف، کارایی عملیاتی در محدوده ۷۷-۸۷ درصد، کارایی محیطزیستی در محدوده ۸۰-۹۰ درصد و کارایی محیطزیستی-اقتصادی در محدوده ۸۷ تا ۹۵ درصد متغیر است. این امر بیانگر توان بالای مدیریتی شالیکاران این منطقه در استفاده بهینه از نهاده‌ها بوده است. بنابراین، بدون تغییر در سطح تکنولوژی و با میزان نهاده موجود، می‌توان سطح فعلی محصول را تا رسیدن به مرز کارایی افزایش داد. کارایی عملیاتی، محیطزیستی و محیطزیستی-اقتصادی گندم کاران منطقه به ترتیب در محدوده ۶۷ تا ۷۹ درصد، ۷۰ تا ۸۱ درصد و ۷۷ تا ۸۶ درصد نوسان دارد. به عنوان مهمترین دلایل کاهش کارایی مدیریتی گندمکاران در منطقه عقیلی می‌توان به افزایش ضایعات، ضعف آگاهی کمباین‌داران و انبارداران، عدم آشنایی صحیح کشاورزان با اصول مدیریت آفات و اصول اولیه علمی کشت گندم، عدم هماهنگی بین زمان صحیح برداشت گندم و شرایط مناسب محصول گندم در مرحله برداشت، عدم آشنایی صحیح کشاورزان با اصول مبادله، بازاریابی و حمل و نقل صحیح محصول اشاره نمود.

نتایج میانگین کارایی منطقه دیمچه در جدول ۷ نشان داد که محصول نیشکر بالاترین میانگین انواع کارایی را به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف با کسب امتیازات در محدوده ۷۸ تا ۹۰، ۸۰ تا ۸۹ و ۸۷ تا ۹۵ به ترتیب برای کارایی عملیاتی، محیطزیستی و محیطزیستی-اقتصادی به خود اختصاص داده است. این امر نشان‌دهنده استفاده بهینه تر کشاورزان از منابع موجود و توجه به مسائل محیطزیستی بوده است. کمترین میزان متوسط انواع کارایی منطقه دیمچه متعلق به محصول ذرت با کسب امتیازات در محدوده ۶۶ تا ۷۵، ۷۰ تا ۷۹ و ۷۹ تا ۸۵ به ترتیب برای کارایی عملیاتی، محیطزیستی و محیطزیستی-اقتصادی بوده است.

به طور کلی، چهار سطح متفاوت احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود (P) برای بررسی تأثیر داده‌های غیردقیق بر نتایج مسئله مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین سطح محافظه کاری در مناطق مورد بررسی در مقابل داده‌های نامطمئن در سطح $P=1$ و کمترین آن در سطح $P=0/1$ می‌باشد. کارایی محیطزیستی-اقتصادی در سطوح ۰/۵ و ۰/۸ برای محصولات یونجه، لوبیا و باقلا در منطقه گتوند، سبزیجات در منطقه عقیلی و در نهایت دو محصول ذرت و گندم در منطقه دیمچه یکسان بود. بنابراین می‌توان نهاده‌های مورد استفاده را بدون کاهش در تولید محصول تا حد زیادی کاهش داد.

نامطلوب گاز CO_2 ، به برآورد کارایی محیطزیستی پرداخته شد. پس از آن، با تلفیق نهاده‌های مطلوب و نامطلوب، کارایی محیطزیستی-اقتصادی برآورد گردید. در جداول (۵، ۶ و ۷) نتایج حاصل از برآورد کارایی عملیاتی، محیطزیستی و محیطزیستی-اقتصادی به ترتیب برای مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه با استفاده از مدل RDEA در سطح عدم اطمینان ۰/۱، ۰/۵، ۰/۸ و ۱ و سطوح متفاوت P برای مزارع تحت بررسی ارائه شده است. بنابراین با افزایش انحراف هر محدودیت از کران خود (P)، سطح مطلوب نهاده یا ستاده تغییر می‌نماید.

شایان ذکر است در سطح احتمال انحراف از محدودیت ۱، مدل RDEA تبدیل به مدل DEA متداول گردید. همان‌طور که در جداول (۵، ۶ و ۷) ملاحظه می‌شود، در سطح $P=1$ (کمترین میزان حفاظت سیستم در مقابل داده‌های غیردقیق و به عبارت دیگر مدل DEA)، میانگین نهاده‌های مورد استفاده مزارع بیشتر و میانگین ستانده‌های حاصله کمتر از میانگین سطح مطلوب نهاده‌ها و ستاده‌ها است. نتایج حاصل از برآورد کارایی محیطزیستی-اقتصادی با نتایج مطالعات مردانی نجف‌آبادی و ضیایی (Mardani Najafabadi and Ziaee., 2015; Mardani Najafabadi and Abdshahe, 2018) مطابقت داشت. همچنین نتایج نشان داد به استثنای لوبیا در منطقه گتوند، برای کلیه محصولات در هر سه منطقه و به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف، میانگین کارایی محیطزیستی بیشتر از کارایی عملیاتی بوده است. این امر بیانگر عدم مهارت کافی کشاورزان در تولید محصولات مورد بررسی بوده است. به عبارت دیگر، نداشتن و یا کم‌بودن دانش فنی کشاورزان در مدیریت استفاده از نهاده‌ها، به عنوان مهمترین علت پایین بودن کارایی عملیاتی می‌باشد.

نتایج برآورد میانگین کارایی در جدول ۵، نشان می‌دهد که بیشترین کارایی محیطزیستی و محیطزیستی-اقتصادی به یونجه کاران منطقه گتوند اختصاص دارد. متوسط کارایی محیطزیستی و محیطزیستی-اقتصادی به ترتیب از ۸۱ تا ۸۹ درصد و ۹۰ تا ۹۶ درصد در نوسان است. با توجه به اینکه میزان مصرف نهاده‌ها برای محصول یونجه در منطقه گتوند بیشتر از سایر محصولات بوده، این امر بیانگر عدم توجه کشاورزان به مسائل محیطزیستی یا به عبارتی، نادیده گرفتن اثرات محیطزیستی ناشی از مصرف بیش از حد نهاده‌ها بوده است. همچنین شالیکاران با کسب امتیاز کارایی در محدوده ۷۵ تا ۸۶ درصد، در سطوح مختلف احتمال انحراف، بالاترین سطح کارایی عملیاتی را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر قابلیت و مهارت شالیکاران منطقه گتوند در افزایش تولید برنج می‌باشد. در نهایت، کمترین میزان کارایی عملیاتی، محیطزیستی و محیطزیستی-اقتصادی در منطقه، متعلق به محصول لوبیا بوده است.

جدول ۵- نتایج برآورد میانگین انواع کارایی محصولات در منطقه گتوند

Table 5- The results of estimating the average efficiency of products in the Goutvand Region		P=1	P=0.8	P=0.5	P=0.1
سطوح احتمال انحراف انواع کارایی					
Deviation probability levels of efficiency types					
یونجه Maize					
کارایی عملیاتی Operational efficiency		0.86	0.76	0.74	0.73
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency		0.89	0.83	0.82	0.81
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency		0.96	0.91	0.91	0.90
لوبیا Beans					
کارایی عملیاتی Operational efficiency		0.63	0.6	0.58	0.57
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency		0.59	0.53	0.52	0.51
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency		0.65	0.61	0.61	0.6
باقلا Beans					
کارایی عملیاتی Operational efficiency		0.83	0.78	0.75	0.74
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency		0.86	0.81	0.79	0.78
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency		0.91	0.86	0.86	0.85
برنج Rice					
کارایی عملیاتی Operational efficiency		0.86	0.79	0.76	0.75
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency		0.87	0.8	0.78	0.77
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency		0.95	0.90	0.89	0.88
سبزیجات Vegetables					
کارایی عملیاتی Operational efficiency		0.84	0.76	0.74	0.72
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency		0.85	0.76	0.75	0.73
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency		0.91	0.83	0.82	0.81
گندم Wheat					
کارایی عملیاتی Operational efficiency		0.78	0.71	0.68	0.67
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency		0.83	0.77	0.75	0.73
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency		0.88	0.81	0.8	0.79

مأخذ: یافته‌های تحقیق

Source: Research findings

جدول ۶- نتایج برآورد میانگین انواع کارایی محصولات تحت مطالعه منطقه عقیلی

Table 6- The results of estimating the average efficiency of types of products under the study of the Aghili Region

سطوح احتمال انحراف انواع کارایی		P=1	P=0.8	P=0.5	P=0.1
Deviation probability levels of efficiency types					
کارایی عملیاتی	برنج	0.87	0.80	0.78	0.77
Operational efficiency	Rice				
کارایی محیط‌زیستی		0.90	0.83	0.81	0.80
Environmental efficiency					
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی		0.95	0.89	0.80	0.87
Environmental-economic efficiency					
	سبزیجات				
	Vegetables				
کارایی عملیاتی		0.86	0.78	0.75	0.74
Operational efficiency					
کارایی محیط‌زیستی		0.88	0.81	0.79	0.78
Environmental efficiency					
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی		0.94	0.87	0.87	0.86
Environmental-economic efficiency					
	گندم				
	Wheat				
کارایی عملیاتی		0.79	0.71	0.69	0.67
Operational efficiency					
کارایی محیط‌زیستی		0.81	0.73	0.71	0.70
Environmental efficiency					
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی		0.86	0.79	0.78	0.77
Environmental-economic efficiency					

مأخذ: یافته‌های تحقیق

Source: Research findings

نتیجه‌گیری

هر سه منطقه به استثنای لوبیا در منطقه گتوند، پایین‌تر از میانگین کارایی محیط‌زیستی آن برآورد شده است. این امر نشان‌دهنده عدم قابلیت و مهارت کشاورزان برای تولید محصول مشخص با کمترین میزان به کارگیری نهاده توجیه‌پذیر بود. بنابراین در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در راستای بهبود کارایی محیط‌زیستی محصولات، توصیه می‌شود که ساختارهای تولید و فناوری و به کارگیری هر چه بیشتر از فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست به جای فناوری‌های مخرب و آلاینده مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین در بخش‌های مختلف، جهت کاهش آلاینده‌گی، نظارت دقیق‌تری بر فرآیند تولید محصول اعمال شود.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

مقایسه نتایج کارایی عملیاتی و کارایی محیط‌زیستی بیانگر کم‌توجهی و عدم مهارت کافی کشاورزان در کاربرد صحیح و بهینه نهاده‌های تولیدی بود. لذا ضروری است کلاس‌های آموزشی و ترویجی در راستای توانمندسازی کشاورزان جهت بهبود شیوه‌های تولید و

در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت غلات بخصوص گندم، یونجه، ذرت و سایر محصولات مورد بررسی در مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه استان خوزستان، به تعیین کارایی مزارع پرداخته شد. نوآوری این مطالعه ارائه روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده میزان محافظه‌کاری (RDEA) بود. نتایج حل این مدل برای منطقه مورد مطالعه نشان داد که در سطوح ثابت عدم اطمینان معین و با افزایش میزان احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود (P)، مقدار کارایی واحدهای تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد. همچنین با کاربرد روش مذکور نسبت به روش DEA، نتایج قابل اعتمادتری در رابطه با کارایی به دست خواهد آمد. دلیل این امر انطباق قابل ملاحظه رتبه‌بندی در مدل DEA و RDEA است. بنابراین می‌توان از این روش برای برآورد مقدار کارایی واحدهای تصمیم‌ساز استفاده نمود.

نتایج محاسبه امتیازات کارایی در سطوح احتمال انحراف هر محدودیت از کران به میزان ۰/۱، ۰/۵، ۰/۸ و ۱ نشان داد که میانگین کارایی عملیاتی در تمام سطوح احتمال P، برای کلیه محصولات در

مصرف انرژی و افزایش استفاده از انرژی‌های نو و کمتر آلاینده در جهت افزایش کارایی محیط‌زیستی، امری ضروری خواهد بود. در راستای حفاظت از محیط‌زیست و افزایش عملکرد محصول، پیشنهاد می‌شود که دولت در کنار آموزش کشاورزان، در راستای توانمندسازی آن‌ها به استفاده بهینه از نهاده‌های شیمیایی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی آنان را به سمت کشت محصولات ارگانیک سوق دهد. جهت افزایش کارایی عملیاتی کشاورزان، می‌توان با استفاده از تکنولوژی موجود و استفاده مطلوب از تکنولوژی فعلی کارایی را تا رسیدن به مرز کارایی تولید ارتقاء داد.

مصرف بهینه نهاده‌ها با هدف بهبود درآمد کشاورزان و افزایش سود آن‌ها برگزار شود. در این راستا، سازمان‌ها و دولت بایستی از طریق آموزش مروجان بومی و استقرار آن‌ها در منطقه، علاوه بر رفع مشکلات آموزشی و ترویجی کشاورزان، زمینه مشارکت کشاورزان در برنامه‌های ترویجی و انتقال تجربیات و ارتباط کشاورزان موفق در روش‌های مورد استفاده آنان برای سایر کشاورزان جهت کاهش ناکارایی در مدیریت مصرف نهاده‌ها و خسارات محیط‌زیستی ناشی از مصرف بیش از حد نهاده‌ها را فراهم آورد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی مربوط به سوخت‌های فسیلی و دیزلی است، بهینه‌سازی

جدول ۷- نتایج برآورد میانگین انواع کارایی محصولات تحت مطالعه منطقه دیمچه

Table 7- The results of estimating the average efficiency of different types of products under the study of the Dimche region

سطوح احتمال انحراف انواع کارایی Deviation probability levels of efficiency types	P=1	P=0.8	P=0.5	P=0.1
ذرت Maize				
کارایی عملیاتی Operational efficiency	0.75	0.68	0.67	0.66
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency	0.79	0.73	0.71	0.70
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency	0.85	0.8	0.8	0.79
نیشکر Sugar cane				
کارایی عملیاتی Operational efficiency	0.90	0.82	0.79	0.78
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency	0.89	0.83	0.80	0.80
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency	0.95	0.90	0.89	0.87
گندم Wheat				
کارایی عملیاتی Operational efficiency	0.81	0.74	0.72	0.70
کارایی محیط‌زیستی Environmental efficiency	0.87	0.81	0.80	0.79
کارایی محیط‌زیستی - اقتصادی Environmental-economic efficiency	0.91	0.85	0.85	0.84

مأخذ: یافته‌های تحقیق

Source: Research findings

1. Agricultural Jihad Organization, Khuzestan. (2019).
2. Barghi, H., Hosni-nejad, A., & Shayan, M. (2016). Evaluation of the effects of agricultural chemicals on the environment of villages (case study: villages of Zarin-Dasht city), *Natural Hazards Management*, 4(3), 247-262. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22059/JHSCI.2018.248113.306>
3. Boucekkine, R., Jacek, K., & Thomas, V. (2011). "Environmental quality versus economic performance: a dynamic game approach". *Optimal Control Applications and Methods*, 32(1), 29-46. <https://doi.org/10.1002/oca.927>
4. Beshartadeh, M., Nowrozi, A., & Faizabadi, Y. (2021). Evaluation of economic-environmental efficiency of tangerine production in Mazandaran province with the approach of rural economic development, *Space Economy and Rural Development Quarterly*, 4, 195-219. (In Persian with English abstract)
5. Charles, A., & Cooper, W.W. (1962). Programming with linear fractional functionals. *Naval Res. Logistics. Q*, 9, 181-186. <https://doi.org/10.1002/nav.3800100123>.
6. Despotis, D.K., Maragos, E.K., & Smirlis, Y.G. (2006). Data envelopment analysis with missing values: An interval DEA approach. *European Journal of Operational Research*, 140, 24-36. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2005.10.028>
7. Department of Environment Environmental Organization. (2019).
8. Forleo, M.B., Palmieri, N., & Salimei E. 2018. The Eco-Efficiency of the Dairy Cheese Chain: an Italian case study, *Italian Journal of Food Science*, 30(2), 112-128. <https://doi.org/10.14674/IJFS-1077>
9. Han, Y., Geng, Z., Zhu, Q., & Qu, Y. (2015). Energy efficiency analysis method based on fuzzy DEA cross-model for ethylene production systems in the chemical industry. *Energy*, 83, 685-695. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.078>
10. Lertworasirikul, S., Shu-Cherng, F., Joines, J.A., & Nuttle, H.L.W. (2003). Fuzzy data envelopment analysis (DEA): A possibility approach. *Fuzzy Sets and Systems*, 139, 379-394. [https://doi.org/10.1016/S0165-0114\(02\)00484-0](https://doi.org/10.1016/S0165-0114(02)00484-0)
11. Kazemi, H., Bourkheili, S. H., Kamkar, B., Soltani, A., Gharanjic, K., & Nazari, N. M. (2016), Estimation of greenhouse gas (GHG) emission and energy use efficiency (EUE) analysis in rainfed canola production (case study: Golestan province, Iran), *Energy*, 116, 694-700. <http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2016.10.010>
12. Karimi, F., Pirasteh, H., & Zahedi, K. (2012). Determining the efficiency of wheat farming according to the two factors of time and risk using coverage analysis Open data and windowed data coverage analysis, *Agricultural economics and development*.
13. Mardani, M., Sakhdari, H., & Sabouhi, M. (2011). Application of multi-objective programming and Controller parameters of conservatism in agricultural planning, Case study: Mashhad city. *Journal of Agricultural Economics Research*, 2, 161-187. <https://doi.org/20.1001S.1.20086407.1390.3.10.10.7>
14. Mardani Najafabadi, M., & Ziaee, S. (2015). Determining the efficiency of irrigated wheat fields in Neishabur city under conditions of uncertainty, *Economics and Agricultural Development*, (2) 30, pp. 136-147. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22067/JEAD2.V30I2.49099>
15. Mardani Najafabadi, M., & Abdshahi, A. (2018). Evaluating the efficiency of groves in Ahvaz city under conditions of uncertainty: the application of robust data coverage analysis and Monte Carlo simulation, *Agricultural Economics and Development*, 33(2): 191-204. (In Persian with English abstract)
16. Masuda, K. (2016). Measuring eco-efficiency of wheat production in Japan: a combined application of life cycle assessment and data envelopment analysis. *Journal of Cleaner Production*, 17(22), 373-381. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.090>
17. Nikkhal, A., Khojastehpour, M., Emadi, B., Taheri-Rad, A., & Khorramdel, S. (2015). Environmental impacts of peanut production system using life cycle assessment methodology, *Journal of Cleaner Production*, 92, 84-90. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.048>
18. Nabavi-Pelesaraei, A., Rafiee, S., Hosseinzadeh-Bandbafha, H., & Shamshirband, S. (2016). Modeling energy consumption and greenhouse gas emissions for kiwifruit production using artificial neural networks, *Journal of Cleaner Production*, 133, 924-931. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.188>
19. Ohadi, N., Ahani, E., & Moradi, E. (2020). Determination of technical efficiency in dairy farms of Sirjan city using fuzzy data envelopment analysis method, *Journal of Agricultural Economics Research*, Volume 12, Number 47, pp. 252-237. (In Persian). <https://doi.org/20.1001.1.20086407.1399.12.47.10.4>
20. Ozalp, A., Yilmaz, S., Ertekin, C., & Yilmaz, I. (2018). Energy Analysis and Emissions of Greenhouse Gases of Pomegranate Production in Antalya Province of Turkey, *ErwerbsObstbau*, 1-9 <https://doi.org/10.1007/s10341-018-0380-z>
21. Reports of Khuzestan Province Program Organization, (2016).
22. Rasakhis, S., Shahrizi, M., Shidaei, Z., Jafari, M., & Dehghan, Z. (2015). The relationship between economic efficiency and environmental efficiency: new evidence for developing and developed countries, *Economic Research and Policy Quarterly*, No. 78, Year 24, 31-56. (In Persian with English abstract)
23. Sabouhi, M., & Mardani, M. (2010). Investigating the effect of rainfall on cropping pattern and total gross margin in the right irrigation network of nekouabad diversion dam. *Journal of Agricultural Economics Research*, 5, 202-

221.

24. Sabouhi, M., & Mardani, M. (2013). Application of robust optimization approach for agricultural water resource management under Uncertainty. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 139, 571-581. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)IR.1943-4774.0000578](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000578)
25. Shokouhi, A.H., Hatami-Marbini, A., Tavana, M., & Saati, S. (2010). A robust optimization approach for imprecise data envelopment analysis. *Computers and Industrial Engineering*, 59, 387-397. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2010.05.011>
26. Taate, H., Khosravi, B., Berghae Khatebe, N. (2013). *Investigating the effects of technology and its consequences on the environment*, the third environmental planning and management conference.
27. Ullah, A., Perreta, R.S., Gheewala, SH., & Sonia, P. (2015). Eco-efficiency of cotton-cropping systems in Pakistan: an integrated approach of life cycle assessment and data envelopment analysis. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.10.112>
28. Mardani, M., & Taki, M. (2020). Robust data envelopment analysis with Monte Carlo simulation model for optimization the energy consumption in agriculture. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 1-15. <https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1777221>
29. Mardani Najafabadi, M., Mirzaei, A., Abdesahi, A., & Azarm, H. (2020). Determining the efficiency of broiler chicken units in Sistan region, using interval data envelopment analysis and Mont Carlo simulation approach. *Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research*, 51(2), 179-194. <https://doi.org/10.22059/IJAEDR.2019.273150.668695>